**Epicentre / Médicos Sin Fronteras (MSF)**

# Encuesta retrospectiva sobre mortalidad en Gaza

## Antecedentes y objetivo

Cuando se superaban los 15 meses de la campaña genocida llevada a cabo por las fuerzas israelíes en Gaza, Epicentre, el centro investigación epidemiológica de Médicos Sin Fronteras (MSF), realizó una encuesta retrospectiva sobre la mortalidad entre parte de su personal palestino en Gaza y los miembros de sus familias. El objetivo era cuantificar la mortalidad y la morbilidad dentro de este grupo y comprender el acceso a los servicios de salud.

El objetivo principal de la encuesta era estimar la tasa bruta de mortalidad e identificar las principales causas de muerte entre el personal palestino de MSF y sus familias en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Los objetivos secundarios incluían evaluar la prevalencia de lesiones y enfermedades recientes y describir el acceso a la atención sanitaria (incluido el tratamiento de enfermedades crónicas) durante la guerra.

## Metodología

- **Diseño del estudio:** Encuesta transversal retrospectiva sobre mortalidad.
- **Población:** 436 hogares palestinos, todos ellos del personal palestino de MSF. Estos hogares comprendían un total de 2.523 personas. Los hogares elegibles incluían a todas las personas que vivían en el hogar una semana antes del inicio de la guerra, así como a los niños nacidos durante el periodo del conflicto.
- **Período de la encuesta:** 29 de enero - 26 de marzo de 2025.
- **Período de recuerdo:** 7 de octubre de 2023 - fecha de la entrevista.
- **Datos recopilados:** El cuestionario estructurado recopiló información sobre la composición de los hogares, las muertes, las lesiones, las enfermedades recientes, las enfermedades crónicas y la atención materna. Las muertes notificadas por los encuestados se cotejaron (por identificación, nombre y fecha de nacimiento) con la base de datos pública del Ministerio de Salud de Gaza sobre muertes violentas.

## Principales conclusiones

### Tasas de mortalidad

- **La tasa bruta de mortalidad** fue de **0,41 muertes por cada 10 000 personas al día**, lo que supone aproximadamente **cinco veces más** que las estimaciones previas a la guerra del Ministerio de Salud de Gaza para toda la población.
- **La tasa de mortalidad de menores de cinco años** fue de **0,70 por cada 10 000 personas al día**, unas **diez veces superior** a los niveles anteriores a la guerra.
- **La tasa de mortalidad neonatal** se calculó en **42,3 muertes por cada 1000 nacidos vivos**, aproximadamente **seis veces superior** a las cifras anteriores.

### Causas y datos demográficos de las muertes

- La mayoría de las muertes (**74 %**) se debieron a traumatismos, **principalmente por lesiones causadas por explosiones (98 %)**.
- **El 40 %** de las muertes causadas por la violencia se produjeron entre **niños menores de diez años**.
- Las muertes se distribuyeron de manera uniforme por sexo.
- A medida que el conflicto se prolongaba, observamos un aumento de las muertes no violentas con el paso del tiempo
- Entre las muertes relacionadas con traumatismos con número de identificación, el 88 % coincidían con las entradas del registro oficial de muertes violentas del Ministerio de Salud.

Cabe destacar que ninguna de las muertes atribuidas a causas no violentas de la encuesta de Epicentre figuraba en la lista del Ministerio.

**Morbilidad y lesiones**

- **El 44 %** de todos los miembros del hogar declararon haber padecido al menos una enfermedad en el mes anterior a la entrevista.
- El **7 %** de todos los miembros del hogar resultaron heridos, 9 de cada 10 por explosiones de bombas y disparos.

**Acceso a la atención sanitaria**

- El 86 % de los heridos recibieron tratamiento, principalmente en hospitales y hospitales de campaña.
- Entre las personas diagnosticadas con una enfermedad crónica, **el 68 %** sufrió una o más interrupciones en el tratamiento durante el conflicto. En promedio, la interrupción más larga duró casi 120 días.

**Desplazamiento forzado y vivienda**

- La mitad del personal de MSF y sus familias se vieron obligados a cambiar de casa cinco veces o más en 15 meses.
- Dado que el 98 % de las viviendas del personal de MSF quedaron parcialmente (39 %) o totalmente destruidas (59 %), muchas familias se vieron obligadas a vivir en tiendas de campaña.

**Conclusiones**

Los resultados de esta encuesta ponen de relieve el impacto devastador de la campaña genocida de las fuerzas israelíes en Gaza sobre el personal palestino de MSF y sus familias en la Franja.

A pesar de su función como proveedores de atención médica responsables de cuidar a innumerables pacientes heridos y de ser testigos diarios de muertes, también han sido desplazados a la fuerza en numerosas ocasiones. Muchos viven en tiendas de campaña debido a la destrucción parcial o total de sus hogares.

Las tasas de mortalidad entre sus familias han aumentado drásticamente, especialmente entre los niños y los recién nacidos. Las muertes dentro de las familias de MSF se debieron principalmente a explosiones de bombas y disparos, y los niños pequeños se vieron afectados de manera desproporcionada.

La mayoría de las muertes violentas registradas en la encuesta correspondían a entradas en la lista del Ministerio de Salud de muertes violentas relacionadas con la guerra, mientras que no se identificó ninguna muerte no violenta en dicha lista, lo que respalda la validez del número de muertos notificado.

Es importante señalar que esta encuesta no es representativa de la población general de Gaza y no refleja la reanudación de la escalada de violencia que se ha producido tras el fin del alto el fuego en marzo de 2025. No obstante, ofrece una instantánea crítica del coste humano del conflicto y pone de relieve la **urgente necesidad de proteger a la población civil y al personal sanitario, así como de establecer un alto el fuego inmediato en Gaza**.